

重校宋竇太師瘡瘍經驗全書

重校宋竇太師瘡瘍經驗全書卷之七

宋燕山竇漢

明三衢大酉

目錄 凡九症

大麻風毒圖說方八

天疱瘡圖說方三

冷疔圖說方一

癩瘡圖說方九

眉疔瘡圖說方一

頰疔瘡圖說方一

赤遊丹圖說方二十一

鼻痔圖說方九

附痔漏症方五十二

第七卷目錄畢

重校宋寧太師瘡瘍經驗全書卷之七

圖論方

大麻風毒



治麻風毒用胡麻散

胡麻子

十二兩

苦參

荊芥

何首烏

威靈仙

各八兩

白蒺藜

八兩

防風

菊花

甘草

石菖蒲

牛旁子

各八兩

右為細末用好酒調下日午半夜服之

白花蛇丸

白花蛇

一條

酒浸

白附子

天麻

牛膝

各二兩

當歸

酒浸

何首烏

二兩

姜蚕

炒

威靈仙

二兩

羌活

獨活

防風

草薢

蔓荊子

苦參

各一兩

甘草七錢 石菖蒲二兩 蟬殼一兩 白芍四兩 川芎一兩

蒼耳草四兩 雷花三兩 赤芍一兩 風子肉三兩 煨一兩

雄黃五錢 皂角三兩 烏藥

右為細末煉蜜丸如桐子大每五十九空心好酒送

下

蕪美酒 治久患枯癯三十年癩着林及諸惡風眉毛

脫落

生地 獨活 丹參 白附 甘遂二兩 赤脂二兩

乾姜 蕪荑 麥冬 堯花 蘇子一升 桐子仁

茯苓 茯神 金牙 薯蕷 白朮 蔓荊子

杜仲 石楠 白芷 人參 烏頭 山茱萸

狼毒 川椒 防風 細辛 牛膝 寒水石

麻黃 當歸 柴胡 烏藥 牡蠣 枸杞子

桔梗 狗脊 天雄 石斛 桂心

右計四十二味以酒二斗浸夏三日春秋六日冬九

日合用

秦朮散 治手足痠疼皮膚一身盡痛眉毛脫落耳聾

濕痒

又方	治眉毛脫落生髮
養草	烏頭
甘草	川芎
防風	酒浸服之

白芷	附子	防風	川芎	養草	辛荑	細辛
當歸	川椒	大黃	猪膏	荆子	馬髻膏	玉

大麻風論

人身中有八萬戶蟲共成人身無戶蟲則人身不成不

立復有諸惡諸癩橫病諸風若生必害于人身也皆因
喜怒不節坐卧湿地故為癩疾也宜服

黑白散 治大風麻癩眉髮脫落及癩遍身生瘡遷延

歲月猶如癬疥或如魚鱗其症不同痛痒不一若服

百日眉毛再生仙效甚應

烏梢蛇三兩白花蛇三兩將黑白二蛇片好酒浸一宿

川烏一兩手切片如取出皮骨川肉何首烏草烏一兩同川烏

取出油石菖蒲 荊芥 薄荷葉 白芍

木香 當歸 防風 白芷 川芎

天麻

羌活

獨活

甘草

各一兩

大黃

四錢

自然銅

三錢

火燒赤色

好醋

滓七次

另研細入

用

如患人稟受虛弱或遇中年將荊芥大黃羌活獨活薄荷各退一半用右二十味並製度為末每服一錢酒調服夏月冷冬月熱服之一日三服午前茶清調服如能用一半末子打酒糊為丸每服七丸至十九丸加至十五丸茶清送下一日亦三服隻日服九子雙日服末子按巢氏云風者十有九症為癩病有蟲者迂延年歲多死余傳此方果為應効可以全生洗浴除蟲法具述于

後

淋洗浴湯法 治大風毒氣生瘡五蟲食肌痒痛如癰
疥之類或如魚鱗之形赤黑癰疹瘡並皆治之

何首烏 苦參 荊芥 朴硝

右先用四味各剉四兩水十五碗煎沸却入雄黃白
凡各五錢乳末初入合煎二三十沸去滓淋洗留滓
再煎又加雄黃白凡末共各三錢煎淋洗 未煎藥
先用蠟脂同好麻油勻和用鵝毛掃遍身有瘡又膿
血痒甚處了却將藥湯同候少時其虫聞香必出方

用湯洗煎服煎藥百日可愈如或有一切入還年深
風毒瘡者皆可服之

解風丸

荆芥穗

防風

白蒺藜

苦參

胡麻子

薄荷

右各等分為末皂莢水和為丸一日服四五次用百
沸湯或清飯湯送下

天泡瘡

三ノノノノノノ

三



此瘡之發不拘老幼受酷暑熱毒之氣蒸入肌肉初生
一疱漸至遍體漫爛無休合家相染此症須要淨湯淋
洗切勿以穢氣觸之內服清肌燥濕湯外用泥金刮毒
膏

清肌燥濕湯

蒼朮	白朮	升麻	甘草	澤瀉	木通	生地
白芍	苦參	黃柏	知母	黃芩	茯苓	枳殼
連翹	小柴胡					
水二鍾	姜三片	棗肉二枚	煎服			

泥金刮毒膏

韭菜地上蚯蚓糞錢三玄明粉錢二滑石末錢一研細末用
新汲井水調勻鵝毛潤患上三兩日然後再用茶洗
淨將棋榔天花粉黃連黃柏末各一錢面粉四錢和
勻乾摻自愈

又方

白荷花貼之

冷瘡



夫冷瘡者臟腑虛寒腠理毒惡腹中熱氣薰于肺而肺

主皮毛故發于肌膚損傷榮衛乃有四瘡之名血瘡者
風熱注于皮間紫瘡者赤暈行于時氣風瘡者四肢如
疥瘡之痒冷瘡者膿水長流不得乾息若不早治日久
深入骨髓損傷元氣命必難保治法以消風解毒活血
除濕之劑為主并附搽藥于后

十神散

輕粉

三

松香

三

杏仁

三皮尖

風子

三

栢才

三寒炙

硫黃

二另研

枯凡

三

飛丹

三炭水飛

面粉

三

鷄內金

三存性

乾用桐油調搽入肌肉濕用乾搽

小兒瀨瘡



諸癩瘡

松香

四兩

川椒

二兩

白凡

二兩

輕粉

五錢

黃丹

五錢

右為細末陳菜油調搽

如聖膏

清油

八兩

巴豆肉

錢三

當歸

五錢

輕粉

二錢

黃蠟

三兩

右為末先將油鍋內次入巴豆歸末后下蠟溶收之

頭耳面瘡瘡

枯凡

松香

黃丹

輕粉

平底紅

甘蔗灰

五倍

銅青

各為末先用葱椒煎湯洗淨乾擦或

用菜油調和搽入肌肉見効

辣梨瘡

先用黃蘗汁洗之醋湯亦可

皂莢

七莢廩內浸七日洗淨晒干火煨

榆白皮

燒枯

牛烟膏

輕粉

銅青

霜毒肉浸油調搽

又方

諸小魚胆搗爛加生凡再搗搽瘡上入肌肉

又方

治一切風疔痒疥終年不効

輕粉

鷄內金

銅青

栴柳

下冰

雀梅藤皮

煨灰

各等分為末搽入肌膚內

又方

剃去頭髮用糯米煮極爛搗碎泥頭上其蟲盡

在端米中_法日後脫落其髮日生方得除瘡此一妙也

服酒製防風湯

防風 黃芩_酒 升麻 甘草 蒼朮 金銀花

川芎 生地 當歸 白芷 連翹 鼠粘子

羊鬚瘡

五倍子 和棗肉_{煨三錢} 銅青 一錢 枯凡 二錢 輕粉 二錢

松香 二錢 羊鬚 三錢 煨灰如無以楊柳根代之

黃連 一錢 律水 一錢 檳榔末 杏仁_{去皮} 風子肉_{各三錢}

右為細末香油調付之

眉疳瘡



治小兒眉瘡瘡耳額瘡用射香散

射香散

香附一兩 銅青五錢 射香五分

右為細末用米泔洗淨瘡濕乾搽瘡乾用油調搽并
治耳頰牙疳

治法具在小兒癩瘡之內

癰疽瘡




治小兒鼻唇齲瘡 此症受在心肝脾胃因食炙甘甜
燂熱毒所傷為瘡流滯皮處結成惡毒或有白風或有
弄風此小兒之疾眉瘡鼻唇牙齲先服牛黃清心丸次
服敗毒流氣飲治之

如治牙口瘡用米泔水漱淨用前喉科米片散內量加
珠子銅青枯凡

齲音銀齒牙之根曰齲

赤遊丹



小兒患此赤丹皆從母胎中受蘊熱故發皮膚遊走不
定但熱起于四肢收者輕四肢収于腰者重急治得生
小兒赤遊丹固蘊熱所致即胎毒也或母懷胎之時好
食辛辣毒物沐浴熱湯冬天炭火以致熱氣入胎嗜慾
無度或生下火烘衣裳或火烘床褥以致熱毒內外交
攻半歲上下無有不發者初起身體發熱如火視之其
色紅赤亦啼哭不止其光遊走不定發于四肢生發于腰
腹者尤急用硃銑去其紫血自上而下則毒血流下
不可以遲急用乳香末雞子清調勻塗硃處時用芭蕉

根汁塗之內服珠砂化毒丹生蜜調下再服紫金錠水
磨汁下

拔毒濟生散

牛黃二分 珍珠五分 冰片一分 鬱金如無蟬肚姜黃代之一錢

犀角錢二 辰砂二錢 綠豆粉錢二 文蛤末五分

或加化毒丹 生蜜糞清調下若加粉草末尤妙
乳母流氣飲

歸須 赤芍 升麻 黃連 甘草 鼠粘子

連翹 生地 黃芩 薄荷 青皮 天花粉

木通 黃栢 檳榔 小柴胡

又方 露天客厠內糞清和水花珠搽之亦妙

又方 熱蟥血塗之即愈

凡丹入于腹中飽悶臍凸体若燔炭倉公復生不能治
矣

或遊丹發于頭者何以治之必須將患兒眠在床上以
脚根一頭加磚一二塊以墜毒氣于頭用磁鋒砭之
使毒氣毒血從頭頂而出若乳母抱立在身砭之
則毒氣順下遂壅咽喉必難生矣近覩同道之友顛

倒砭之不得其手法以害諸兒故不辭瑣瑣又明言之并附十丹毒于后

小兒十種丹毒

一飛竈丹從頭頂腫起漸發紅腫頸項俱浮眼睛紅色用生葱一束搗爛取汁塗之又方以朴硝五錢雄黃末二錢和勻芭蕉根汁調和用敗筆蘸汁潤之須令病者卧之將此汁自下潤至顛頂其毒從百會穴出若隨下潤之則毒氣侵于咽喉亦難治者大人患此亦同治法

二吉竈丹從頭額腫痛用赤小豆末雞子清調付之前
方亦妙

三鬼火丹從面上起赤腫用伏龍肝末鷄子清調付再
用芭蕉根汁潤之益母草灰為末醋調付之亦妙

四天火丹從背上起赤點用桑皮末羊脂調付之

五天竈丹從臂上起赤腫黃色用柳樹枝燒灰為末蜜
調付之

六水丹兩脇虛腫用生鉄屑末或針砂或銹丁末猪糞
調塗

七胡火丹從臍上起黃腫用檳榔末米醋調付之

八野火丹從兩脚上起赤腫用乳香末羊脂調付之

九烟火丹亦從兩脚上起赤白點用猪槽下土麻油調
搽

十胡漏丹從陰上起黃腫用屋漏處土羊脂調搽
又方

用瓦花搗汁和水取汁同伏龍肝末塗潤之

小兒爛皮火丹

蓮蓬煨灰面粉 伏龍肝 栢末和勻為末乾搽

凡小兒火丹或頭上起或背上起者俱用慎火草搗汁
搽上慎火草即瓦花

又方

芊芊活隨處有之取汁搽之

并附小兒生下滿身無皮但是紅肉速以早稻米粉乾
撲生皮方止

又方

以伏龍肝末雞子清調塗土壑泥研末塗亦可

鼻痔 一名息肉



居面中為一身之血運而鼻孔為肺之竅其氣上通
腦下行于肺若肺氣清氣血流通百病不生肺氣盛
一有阻滯諸病生焉鼻孔中息肉名曰鼻痔皆由六氣
七情所感而成若生上入眼名曰弩肉若生下入鼻中
名曰息肉窒塞不通戒酒絕慾除煩惱戒憂愁內服煎
劑外用點藥庶平復矣

通氣辛夷散

藥本

羌活

防風

薄荷

白芍

辛夷

升麻

甘草

川芎

當歸

生地

黃芩

連翹

桔梗

白芷 黃連 麥冬 柴胡 山梔仁

水二鍾姜一片煎服

消痔散

蜜陀僧錢一分 白礬錢一錢 煨法陀僧礬四邊信

居其中放在新瓦上煨烟盡為度入地下一夜出火
毒取出加射香二分為末吹入鼻孔內時用手指揉
鼻上下三百度其藥味漸入痔易化水矣外用搜濕
麵糰塞鼻孔使藥味上行一日三四次點之其藥磁
罐收貯

又方

仰卧時用白葡汁滴入鼻孔中即消

又方

鷄內金

炙研末五錢

細

射香三分鴨嘴胆九二錢

銅綠二錢枯九一錢

右各研極細和勻磁罐收貯以蠟固口勿令出氣臨用時點鼻中如前法夜間多點之其息肉十日之內漸漸脫落或點藥揉鼻后出水不須憂慮此息肉所化也如不能盡脫用鑷子徐徐擺動取出亦可恐落

凡其根不能盡去再點藥四五日以絕其根凡點藥務探之

附鼻不聞香臭通氣湯

羌活 獨活 蒼朮 防風 薄荷 荊芥 升麻

乾葛

各錢

甘草 五川椒

白芷 冬天加麻黃一錢

水二鍾姜三片棗二枚葱白三寸煎

附酒鱉鼻

四五年久藏糟茄露調硫黃末塗之四日後即消
連翹仁細茶各半為末臨睡茶清送下三錢

附鼻衄 山梔燒灰為末吹鼻內 或田螺水滴入鼻
耳鼻出血方

射香一分 沉香三分 白凡一錢 糯米五十粒

各為細末 麵糊丸如豆 大絲綿包之 如鼻中出血塞
于兩耳耳中 出血塞于兩鼻 如左耳出血塞右鼻孔
如右耳出血塞左鼻孔 如左鼻孔出血塞右耳孔 如
右鼻孔出血塞左鼻孔 即愈

前藥二神湯耳鼻皆可服

生地一兩 麥冬一兩 水煎服之

五痔并圖說附

凡痔有五即牡痔牝痔腸痔脉痔血痔素問曰因而飽食筋脉橫解腸澼為痔臟腑所發多由飲食不節醉飽無時恣食肥膩胡椒辛辣炙煨醞酒禽獸異物任情醉飽耽色不避嚴寒酷暑或久坐湿地恣意耽看久忍大便遂致陰陽不和閉格壅塞風熱下衝乃生五痔天道失常民心益肆今痔變成五五二十五類或左或右或內或外或狀如鼠舐形如櫻桃或膿或血或痛或痒或腫或瘻久而不治漸成漏矣大法以涼血為主徐徐取

二
三
効切不可用砒霜毒藥亦不可輕易割取致成漏瘡又
有肛門左右別有一竅出膿血名曰單漏治之須以溫
煖之劑補其内生肌之藥敷其外其竅在皮膚者易愈
臟腑有損而致竅者未易治也 甲子冬夢麟謹識

二十五類圖註

蓮子痔



狀如蓮子

通腸痔



其根生於臟
出其即下

氣痔



感氣即下

漏痔



氣血衰敗
久勞滯膿
不自洗淨

勾腸痔



其形遠
腸頭者

蓮花痔



形如蓮花

鷄心痔



其形如鷄心

垂珠痔



其形垂下如珠

貫煉痔



穿而貫

栗子痔



其形如栗子

菱角痔



形如菱角

盤腸痔




盤腸而生

子母痔



大小

翻花痔



形如翻花
登廁即出

鼠妳痔



形如鼠妳

雙頭痔



有兩頭

泊腸痔



繫泊肛門者

夫妻痔



一圓一長
即雌雄也

脫肛痔



肛門脫
下痔漏

三迷痔



有三珠財迷色
迷酒迷較多之

血攻痔



即血出

珊瑚痔



形如珊瑚

擔腸痔



其痔橫
在肛門

櫻桃痔



形如櫻桃

雌雄痔



酒色食毒不
慎此間黑色

右諸疴名類不同其種則一何也皆由大腸傳道以成
風熱滯而腎虛為冷氣相攻飽食猪鷄魚膾燒酒醞酒
生酒立辛辣等味或登廁臟虛為風邪所襲六氣七情所
感人生一素不能飲酒亦患痔者臟虛故也亦有父子相
傳者母血父精而成腸風者血痔之漸也速服涼血補
劑少勞戒怒遠色忌口斯能愈矣

法製枯藥法

信

一兩

白丸

三兩

非丹

五錢

硃砂

五錢

芭豆

五粒去殼

先將凡一两半安於瓦盆中隨將信摻在凡上再將凡
覆上火熬枯取出為末加硃砂末五錢和勻碾細末如
塵先用魚腥草煎湯洗淨每用少許点上少頃黃水漸
出一日夜三四次如無魚腥草或茶藤花或野薔薇花
紅白槿樹花代之或甘草湯亦可

今用藥開於後

護肉藥

鬱金

五錢

黃連

五錢

白芨

三錢

右為末用蜜水調稀先將此藥塗在痔四邊好肉上卻

用薄紙貼定固濟了好肉方用痔藥點之

痔漏千金祕方

用牡蠣二兩煨過入地窰坑埋之去火氣為細末痔漏瘡若濕乾搽若乾以津調搽痔上

又祕方

砒霜

白色明淨者五錢

白凡

一兩二錢明淨者

黃丹

六錢飛過三次煨乾

草烏頭

二錢為末紫背皮生用

蝎梢

八個瓦上煨乾

右件用舊鐵杓或熟鐵銚先將炭燒鐵銚透紅放冷摺

拭淨將砒打碎如豆大將白礬燒令滾沸將碎砒投簍內拌勻以文武火煨旋旋攪入草烏蠟稍黃丹同研末收放新小瓶內如用先將痔漏以甘草湯或蔥湯洗淨將生麻油調藥少許以鴨翎掃藥在痔漏上日三次第一日第二日瘡內必出黃水如膠其痔漸消看漏深淺就將薄綿紙裹猪鬃三根先入在漏內試漏深淺就將藥紙撚之藥插入漏內其藥紙撚久不取出如換藥紙撚方取出再換新藥紙撚入漏內日上三次蚤午晚用藥俱要洗淨漏用藥三五日痔漏頭併瘡口俱黑色然

後不用紙撚藥其漏瘡根自落如漏不深入肉上用藥點搽如瘡紅活平復不收口方用生肌散藥敷之立愈其瘡根永再不發矣

生肌長肉藥

血竭

五錢

龍骨

五錢

光粉

二兩

白芷

五錢

黃州

三錢米飛炒

煆石膏

五錢

五錢

海螵蛸

五錢

黃柏

二兩

五倍子

二兩

右為細末如瘡孔深用蘆管吹入裏面如瘡口淺止乾摻入肉生肌平復不用

點痔藥

冰片

乳香

沒藥

熊膽

俱為末用蝸牛一枚碎其底入前四末放盞內化水以銀簪滴汁痔上甚効 田螺代之亦可

痔漏藥

用銅杓內制牛黃末一分先炒微烟即下礞末二錢候烟起再下白礬末九錢待滾乾取起仍入火微炒煨安地上出火毒為末後入乳香辰砂沒藥冰片各一錢其為極細末每用一錢許以稠糊調和隨漏孔大條子量

深淺長短用之如瘡孔爛大止用津唾調之填入孔內
待痔已潰動毒水自流如好肉生瘡即以五黃膏護外
如入錠時仍用唾調前藥末付在痔根上如痔根脫落
搽生肌散并多服蠟礬丸

生肌散

龍骨

煨

海螵蛸

赤石脂各錢乳香

沒藥

血竭

輕粉

雄黃

各分

未出毛小兒二枚炙乾

各為末如塵臨用加水片少許

又生肌散

寒水石

煨二錢

龍骨

煨五分

乾胭脂

輕粉

一分

為細末乾搥新瘡加薄荷一分老瘡依此

辰砂錠子 久痔成漏

信

二錢

白凡

二錢

蜜陀僧

辰砂

五分

先研信細入磁盆中次用凡舖信上烟盡為度再將蜜陀僧辰砂研細白麵一些和作尖錠子頑漏納瘡口府去腹肉方可生肌

盤腸通腸痔散

痔在內用此敷之痔頭頂自出以前藥枯之

磁石

錢

枯凡

五

白乾薑

五

草烏尖三枚

右為末葱汁調敷

痔腫者

用殼木煎五倍為末蜜水調敷

諸痔

用蜈蚣五枚搗碎水銀一錢射香三厘冰片五厘用銀

煎汁滴患上

痔漏

用團魚一枚扯出頭殺之取血即將團魚頭燒灰為末
血為丸如棗核大諒痔大小為之入內
漏孔不合

用石楠葉煎湯放在桶內薰洗待湯通手乾將漏洗淨
後將黃牛面前牙齒四枚裝在小瓶內用木屑燃之待
白烟出為度取出研末用津液蘸牙末點入漏孔處出
黃水為効 黃牛牙齒散預製脩用
益氣清臟湯

人參

當歸

條芩

涼大腸
黃連

生地

赤芍藥

槐角

川芎

升麻

枳殼

寬大腸

秦艽

白朮

茯苓

甘草

水二鍾薑一片灯心廿根煎服

秦艽蒼朮湯

秦艽

一錢 當歸

一錢

澤瀉

防風

各三分

蒼朮

五分

桃仁

錢研為泥

檳榔末

五分

大黃

錢雖大便燥亦不宜多

黃栢

五分若大腸頭沉重者逆勝也更加之
天氣大熱或燥熱喜冷者以意加之

皂莢

燒存性去皮一錢

右用桃仁煨皂三末另外餘作一服水煎上查加三味

末調勻再上火煎一二沸空心服之再食美膳壓之不
犯胃氣忌生冷硬物桃李梅杏菓品油麵大料生薑胡
椒之類第二服如前加木香末三分

秦艽防風湯

痔漏每日大便時發疼痛如不疼痛非痔漏也

秦艽

歸身

防風

白朮

各錢半

黃栢

五

陳皮

大黃

煨各券

粉草

澤瀉

各六分

紅花

一錢

芫仁

三枚

右作一服水煎空心服

秦艽羌活湯

痔漏成塊下垂疣瘡瘡不任其痒惟鷄心垂珠栗子雙頭
子母夫妻櫻桃下垂等痔

秦艽

黃芪

各二錢

升麻

大柴胡

甘草

麻黃

各五分

羌活

一錢

細辛

藁本

紅花

各三分

防風

七分

秦艽當歸湯

痔漏大便結燥疼痛

秦艽

枳殼

當歸

各二錢

桃仁

廿粒

紅花

三分

大黃

四錢

澤瀉

白朮

皂角仁各五分

白水煎

當歸郁李仁湯

痔漏大便硬努大腸下垂多血苦痛不住

皂莢子各五分

郁李仁

麻子仁各五分 秦艽

一錢五分

蒼朮

當歸

生地

各五分

枳實

七分

澤瀉

大黃

煨各三分

水二鍾煎成加皂莢子末切不可在風寒處大小便

紅花桃仁湯

痔漏如勾腸蓮花菱角翻花珊瑚盤腸等痔年久不愈

治法當補北方瀉中央

生地

當歸

紅花

防風

猪苓

各五分

蒼朮

六分

澤瀉

八分

麻黃

二分

黃柏

一錢

木香

二分

白水煎

槐角子湯

外痔併漏根蒂落下然後服此藥除腹內之毒

槐角子

枳殼

黃芪

黃連

各五錢

薄荷

二錢

右咬咀作二服水二鍾煎至八分空心服

木香散 用藥後小便不通服此藥外痔不用

山梔子

木通

車前子

各錢 淡竹葉

生地黃

兩

黃芩

錢

灯心

三十根

右咬咀每服四錢水一鍾半煎七分空心服

又方

痔貼藥之後恐毒未盡將槐米一兩炒黃色用水一鍾煎至七分加酒半鍾溫服之痔永不發矣

草木澤瀉丸

飲酒食熱物脾主大熱而助三焦氣盛火生土也當瀉

三焦若火熱退金得氣而反制木若木受制則五更不
生矣

蒼朮

四兩
去皮

地榆

皂莢子

各兩
燒存性

澤瀉

枳實

秦艸

各二兩

末之搗飯丸每服五十九溫酒米飲任下一方去蒼朮
加白朮

秦艸白朮丸

痔漏有膿血大便結燥腫硬疼痛

歸尾

枳實

澤瀉

白朮

各五錢

秦艽

朮仁 製

皂角仁各三錢 地榆 三兩

末之和朮仁泥煉蜜丸每百丸鹽湯下乾物壓之

槐角丸

槐角去梗為末入烏牛膽內掛透風處為末煉蜜丸每服四十九平胃散作湯下

腸風痔漏下血臟毒

大黃 煨 朮仁 各三分 當歸

檳榔

皂角仁 黃栢 荆芥

枳殼 各五錢

蟬皮 炙 黃連 秦艽

槐角 各二兩

末之麵糊丸每五十九食前白湯下鮮血下者加棕毛蓮蓬灰

大腸內結燥疼痛

秦艽

枳殼

紫赤者各二兩

桃仁

麝

皂角仁七錢

紅花

三分

澤瀉

白朮

黃柏

黃連

防風

當歸

各錢

大黃

麝

末之麵糊丸每六十九白湯下

黃蠟丸

黃蠟四兩丸如桐子大月朔服一丸次日服二丸三日

服三九漸加至月盡三十丸已後每日減一丸至一丸止用酒送下輪流服之其瘡自痊一則不必服矣

潤腸丸

當歸

五錢

枳殼

五錢

百草霜

二兩

錢
大黃

五錢
煨

右為細末糊丸桐子大每服三十九丸白湯下

已破未破痔漏方

當歸

酒浸二宿曬乾火焙

槐角子

炒皮

蛻皮

炒黃

地骨皮

淨曬乾

右為末各等分每服三錢五分空心溫米湯調五更服

之後畧睡一二刻少進米粥但宜乾餅一塊少言語自
早坐至午怡情適性方愈

方

用青荷葉燒灰為末空心酒下三錢

方

用金銀藤并花為末每日酒下三錢

療痔神方

橡子粉

糯米粉

各二升為末炒黃

每用二合滾湯調成餅飯上蒸熟空心食之

壯氣收腸方

治翻花內痔痔頭落腸不收服此藥外痔不用

黃芪

白芷

防風

厚朴

當歸

各二兩

川芎

二兩

蔓荊子

二兩

桔梗

二兩

木香

二兩

人參

三錢

肉桂

五錢

右為細末每服三錢空心棗子湯調下日進三服力壯其腸自收矣

豬肚膏

用雄豬肚一枚去垢淨入皂角刺一兩縛定兩頭煮爛

去藥空心任意吃又不可用鹽醬服三肚後即除根
一人患痔每日食海螺螯半升日鹹以苦茶嗽口約及
二斗又能清心寡慾痔即消矣痔乃臟火屬陽海螯乃
性寒味鹹屬陰寒能敵火鹹能軟堅茶又苦涼之味要
又論之殆有理也

小兒生痔空心服甘草膏自愈

孫真八射香膏

射香 二分

乳香 三分

血竭

四分各為末

右為一處以小紅棗煮去皮核肉和藥作餅依痔大小

放痔上用膏藥貼之痔內血水黃膠水流出此痔患之
毒也一二次即愈

丹溪先生治漏瘡先用補藥以生氣血參芪歸朮為主
大劑服之乃王道平平之劑外以附子末津液作餅如
錢厚放漏處灸之令微熱不可令痛餅乾再易之其
餅隨疔大小為之如困倦止之明日再灸以肉平為度
仍前服補藥搽生肌長肉藥

煎痔方

用大雄鷄宰去血在湯鍋內燂去毛取出鷄將此燂毛

垢湯燒一二沸傾在淨桶內蓋定其氣少頃將陽物放桶上坐薰薰之候湯溫洗痔淨拭乾隨將蜈蚣一條碾木艾二錢和捻成條放馬桶內坐薰之其痔焦熱尤妙新生者一兩次得愈久生者五次得愈條加蜈蚣并艾薰後隨服益氣清血湯秦艽蒼朮湯調治之

沈痔方

馬蘭頭一斤皮硝四兩煎滾坐薰候湯溫洗之
又方

牛膝搗爛煎湯洗之
紅花子打碎煎湯洗之

又方

魚腥草煎湯洗之 白地松煎湯洗之

洗痔國老湯

荊芥 一兩 甘草 一兩 藿香 五錢

右不拘多少煎湯溫洗洗一次用藥一次用藥之後如大便閉塞用此外痔不用

又方

皮硝 鳳尾草 五倍子 韭菜子 等分

水一桶煎數沸放桶內坐之薰洗

脫肛痔

肺與大腸相為表裏故肺臟蘊熱則肛閉結肺臟虛寒則肛脫出此至當之論又有婦人產育過多力盡血枯氣虛下陷及小兒久痢皆能使肛門突出治之惟溫補肺臟滋榮腸胃久則能自收矣

血虛脫肛以四物湯為主氣虛脫肛以參芪歸朮為主血熱以涼血為主四物湯加黃柏

摻藥

乳香

五分

沒藥

三分

血竭

一錢

紅絨灰

五分

牛黃 五分 冰片 二分 珍珠 三分 孩兒茶 五分

象皮灰 三分 昇藥 三分 五倍 二分

右為極細末用後藥湯洗淨乾摻 須要避風

大人小兒摻藥

赤石脂 伏龍肝 各兩

為末付腸頭上日三次

升元大補湯

人參 三錢 升麻 五錢 白朮 二錢 白芍藥 二錢

生地 二錢 歸頭 二錢 黃芪 三錢 黃柏

錢姜汁煮

知母

各錢俱鹽酒製

粉草

五分炙

山藥

錢

防風

錢

肉桂

五分

附子

七分

紅花

六分

右作一服水二鍾薑五片棗肉二枚煎服川芎不用因
泄氣故止之 虛甚倍加參芪歸麻

虛人脫肛補中益氣湯

加黃柏知母蒼朮黃芩肛門痒加秦艽桃仁大便閉塞
加皂角仁

冬至前天道嚴寒其氣極沉極降之際況人身小天地
天在上人居中地居下豈不相應乎治之不能即奏功

也陽生後日長一線陽漸長陰漸消矣宜用灸法治之
無不効者病人亦要戒氣少勞為上策擇晴明和暖吉
日在不通風淨煖室中坐卧取頂上旋毛中百會穴以
醬一匕搽上文灸三壯隨服升元大補湯其肛漸收矣
蓋百會為一身之樞紐大能升提下陷之氣故能奏功
若冬至前不可灸灸之何益次日再灸尾翠骨又灸臍
中隨年壯此法余用之甚効 諸痔漏亦治之

洗法

用生鐵五觔水二斗煎至五升出鐵洗之日三次明日

再易新鐵如前洗之

又方

枳殼

朴硝

川芎

當歸

桑枝

艾葉

各兩

地榆

蒼朮

右煎湯洗之

但肛門收上十有二須服補劑調攝之其餘者漸漸
乾息結痂偶遇喜樂之事忽然脫落一黑圈噫此腸有
餘乃截腸也

重校宋竇太師瘡瘍經驗全書卷第七畢

跋宋太師瘡瘍經驗全書後

天地之大德曰仁仁者生生不息乃天地萬物生成之理也故神農黃帝造命生民嘗百草以治諸病立種繪形圖成本草以詔後世故今之學者知藥性氣味皆賴此書之存也迨黃帝好生之德師岐伯設為問答之詞著內經以垂後人之所未竟醫道斯昭昭矣予家世業醫自宋太師子聲公發迹瘍科繪形成圖因症立方秘藏久矣予次子夢麟棄儒習醫素欲刊行此書以廣前人之緒自揣力薄止之今夏麟兒病中復翻閱太師公書并予試效瘡瘍方

症諸方叩之議論多切實有裨補愕而喜曰向為僉人浸
證責汝違吾意不期汝果能潛心于斯道也更能嚴訓子
姪予深望焉廼以繡梓請命于予者四三予以家窘固却
之復承同心諸友憫予之勤也各助貲樂成其善勉錄成
帙刊行于世推廣濟物一念之仁予性素粗直恒多取怨
于人陷以虛名困役老不能解尚賴斯業貽謀耳凡我後
之子孫務存仁心為大本永繼箕裘毋興貪念以廢世業
遺笑后世實予惓惓之至望也予不文僭書末簡維時為
隆慶戊辰一陽吉旦燕山後裔孔泉寶楠頓首敬跋